



CIPEROX

ANTIPARASITARIO
EMULSIÓN

REG.SAN. 3B1-2-7770-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Cipermetrina 20.0 g
Vehículo c.s.p. 100.0 ml

ESPECIES



DOSIS

DOSIS

EN BAÑOS DE ASPERSIÓN

Usar 20 ml en 20 litros de agua. Fumigar a los animales con suficiente cantidad, dirigiendo la boquilla en sentido contrario a la dirección del pelo para conseguir mayor penetración.

EN BAÑOS DE INMERSIÓN

Usar 1 litro en 1000 litros de agua.

Repetir los tratamientos de acuerdo al grado de infestación de garrapatas, ácaros o insectos.

INDICACIONES DE USO

Está indicado para la eliminación de garrapatas, combate todo tipo de ectoparásitos en: Bovinos, Equinos, caprinos y porcinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

FARMACOCINÉTICA

Cipermetrina: Tiene acción rápida, su eficacia se potencializa, y aumenta su efecto residual.

Actúa sobre los insectos inhibiendo los centros nerviosos motores y sistemas enzimáticos microsómicos. La absorción por la piel de los animales es escasa, por lo que da seguridad en su aplicación.

MECANISMO DE ACCIÓN

Cipermetrina: Insecticida que se absorbe a través del exoesqueleto quitinoso de los artrópodos, tras lo cual estimula el sistema nervioso central, posiblemente por interferencia competitiva con la conductancia catiónica en la capa lipídica de las células nerviosas, bloqueando la transmisión del impulso nervioso. Esto lleva a la parálisis y muerte del insecto.

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES

Usar protección para ojos y manos. Pueden aparecer ocasionalmente fenómenos de irritación local. Incluyendo prurito, urticaria, edema, eczema. Puede ocurrir erosión corneal leve y edema del estroma. No existe antídoto para el tratamiento de la intoxicación de piretroides. El tratamiento debe ser sintomático u de mantenimiento. Los piretroides se



CIPEROX

ANTIPARASITARIO
EMULSIÓN

REG.SAN.3B1-2-7770-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Cipermetrina	20.0 g
Vehículo c.s.p.	100.0 ml

inactivan por el contacto con el aire y la exposición a la luz. La cipermetrina es inflamable y debe evitarse el contacto con oxidantes fuertes, excesivo calor, chispas y llama directa.

Contraindicado en corderos menores a una semana de edad. No administrar en animales durante clima muy caluroso, no aplicar si existe heridas abiertas o expuestas.

ESPECIES



INTERACCIONES

Ninguna reportada

REACCIONES ADVERSAS

Las piretrinas son poco tóxicas en comparación con otros insecticidas.

DOSIS

DOSIS
EN BAÑOS DE ASPERSIÓN Usar 20 ml en 20 litros de agua. Fumigar a los animales con suficiente cantidad, dirigiendo la boquilla en sentido contrario a la dirección del pelo para conseguir mayor penetración.
EN BAÑOS DE INMERSIÓN Usar 1 litro en 1000 litros de agua.
Repetir los tratamientos de acuerdo al grado de infestación de garrapatas, ácaros o insectos.

RETIRO

Carne y leche 2 días.

PRESENTACIONES COMERCIALES

- Frasco de 20 ml
- Frasco de 100 ml
- Frasco de 250 ml
- Frasco de 500 ml
- Frasco de 1000ml