



HEMOSTOP

SUPLEMENTO VITAMÍNICO-
ANALGÉSICO
SOLUCIÓN ORAL

REG. SAN: 10A-8A4-11912-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Vitamina K	4 g
Paracetamol	2.5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

ESPECIES



DOSIS

DOSIS (REFERENCIA 1000 AVES)		
HEMOSTOP	EDADES SEMANAS	PESO PROMEDIO
13,2 mL / 56 L agua	0 - 1	165 g
32 mL / 125 L agua	1 - 2	400 g
72 mL / 174 L agua	2 - 3	900 g
113 mL / 226 L agua	3 - 4	1400 g
160 mL / 264 L agua	4 - más	2000 g

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
Administrar de 3 a 5 días o según criterio del Médico Veterinario.

INDICACIONES DE USO

HEMOSTOP está indicado en casos de deficiencia de vitamina K, por absorción escasa de esta vitamina en el intestino delgado o por administración prolongada de sulfonamidas en el tratamiento de coccidiosis, despiques de aves. Además, presenta acción analgésica gracias a la presencia del paracetamol.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral para añadir al agua de bebida

FARMACOCINÉTICA

Vitamina K: Se absorbe a través del tracto gastrointestinal en los animales monogástricos por medio de los linfáticos intestinales, pero sólo en presencia de sales biliares. La absorción oral puede aumentar significativamente cuando ésta se administra junto con alimento grasoso. Después de la administración oral, el aumento de los factores de la coagulación puede demorarse hasta 6-12 horas.

Paracetamol: Se absorbe fácilmente por la vía GI y alcanza valores sanguíneos adecuados en 15-30 min, con duración variable de 3-5 h, dependiendo de la velocidad de excreción renal. Se absorbe mejor en el intestino que en el estómago. Se biotransforma de manera rápida y se conjuga con sulfato y principalmente con glucurónico (95%). Sólo 3% de la dosis se elimina sin biotransformarse.

MECANISMO DE ACCIÓN

Vitamina K: Es un cofactor utilizado para sintetizar factores de coagulación en el hígado (factores II, VII, IX y X).



HEMOSTOP

SUPLEMENTO VITAMÍNICO-
ANALGÉSICO
SOLUCIÓN ORAL

REG. SAN: 10A-8A4-11912-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Vitamina K	4 g
Paracetamol	2.5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

ESPECIES



DOSIS

DOSIS (REFERENCIA 1000 AVES)

HEMOSTOP	EDADES SEMANAS	PESO PROMEDIO
13,2 mL / 56 L agua	0 - 1	165 g
32 mL / 125 L agua	1 - 2	400 g
72 mL / 174 L agua	2 - 3	900 g
113 mL / 226 L agua	3 - 4	1400 g
160 mL / 264 L agua	4 - más	2000 g

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

Administrar de 3 a 5 días o según criterio del Médico Veterinario.

Paracetamol: El acetaminofén produce analgesia y antipiresis mediante mecanismos similares a los salicilatos (inhibición de la ciclooxigenasa).

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES

Prepare soluciones frescas y deseche sobrantes.

Dosifique de acuerdo a las instrucciones para evitar concentraciones subterapéuticas.

INTERACCIONES

No reportado.

REACCIONES ADVERSAS

No reportado a dosis terapéuticas.

RETIRO

No requiere.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco x 1 l

Caneca x 20 l