



HOLVA FARBIOVET

ANESTÉSICO LOCAL
AEROSOL

REG.SAN: 8A1-12411-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Benzocaína	20 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

ESPECIES



DOSIS

MODO DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Limpiar adecuadamente el área a tratar y rociar con cantidad suficiente de HOLVA FARBIOVET esperar 30 segundos antes de iniciar el procedimiento.
Repetir la aplicación las veces que sean necesarias según el procedimiento o molestias lo ameriten.

DOSIS: Cantidad suficiente para cubrir la parte afectada y superficies adyacentes.

PRECAUCIONES: No usar junto con otros productos químicos como, algunas tintas y productos cosméticos o cualquier producto que contenga parabenos o parafenilendiamina o derivado de un éster.

INDICACIONES DE USO

HOLVA FARBIOVET está indicado como anestésico local en varios procesos como: suturas, castraciones, cirugía menor, corte de orejas, laceraciones de la piel, curaciones de heridas, quemaduras de sol, episiotomías, escaras, golpes.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

FARMACOCINÉTICA

Habitualmente, la absorción y la distribución guardan más relación con la duración del efecto deseado que con su período de latencia, cuando se ha procedido a administrar un anestésico local en la periferia del trayecto de un nervio. Es importante destacar que el hecho de que cuando un anestésico local abandona el lugar donde fue infiltrado, pasa a la sangre y se distribuye en el sistema nervioso central y el músculo cardíaco, donde es posible la manifestación de efecto tóxicos. Sin embargo, la benzocaína prácticamente no se absorbe, y no pasa al torrente sanguíneo. La hidrólisis enzimática es la principal vía metabólica de transformación a estructuras más hidrosolubles de los anestésicos locales con uniones intermedias.

MECANISMO DE ACCIÓN

Impide tanto la generación como la conducción de impulsos nerviosos debido al bloqueo de canales de sodio dependientes de voltaje, presentes en la membrana del axón. Al producirse la unión anestésico local-receptor se impedirían los cambios de conformación de la compuerta del canal que, al no



HOLVA FARBIOVET

ANESTÉSICO LOCAL
AEROSOL

REG.SAN: 8A1-12411-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Benzocaína	20 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

ESPECIES



DOSIS

MODO DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Limpiar adecuadamente el área a tratar y rociar con cantidad suficiente de HOLVA FARBIOVET esperar 30 segundos antes de iniciar el procedimiento.
Repetir la aplicación las veces que sean necesarias según el procedimiento o molestias lo ameriten.

DOSIS: Cantidad suficiente para cubrir la parte afectada y superficies adyacentes.

PRECAUCIONES: No usar junto con otros productos químicos como, algunas tintas y productos cosméticos o cualquier producto que contenga parabenos o parafenilenediamina o derivado de un éster.

abrirse, impediría el flujo iónico con el consecuente bloqueo de la génesis y la propagación de los impulsos nerviosos.

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES

No utilizar junto con otros productos químicos como tintas, productos cosméticos u otros productos que contengan parabenos o parafenilenediamina o derivados de un éster.

Producto de uso externo únicamente.

INTERACCIONES

No reportadas.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente pueden presentarse erupciones en la piel, enrojecimiento, picazón inflamaciones en la boca o garganta y ardor, hinchazón o sensibilidad en el sitio de contacto.

RETIRO

No aplica.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco x 60 ml