



HOLVA FARBIOVET

ANESTÉSICO LOCAL
AEROSOL

REG.SAN: 8A1-12411-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Benzocaína	20 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

ESPECIES



DOSIS

MODO DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Limpiar adecuadamente el área a tratar y rociar con cantidad suficiente de HOLVA FARBIOVET esperar 30 segundos antes de iniciar el procedimiento. Repetir la aplicación las veces que sean necesarias según el procedimiento o molestias lo ameriten.

DOSIS: Cantidad suficiente para cubrir la parte afectada y superficies adyacentes.

INDICACIONES DE USO

HOLVA FARBIOVET está indicado como anestésico local, en las diferentes especies para:

- Suturas.
- Castraciones.
- Cirugía menor.
- Corte de orejas.
- Laceraciones de la piel.
- Curaciones de heridas.
- Quemaduras del sol.
- Episiotomías.
- Escaras.
- Golpes.

VÍA DE APLICACIÓN: Tópica

FARMACOCINÉTICA

La benzocaína es poco potente e hidrosoluble, con baja absorción, por lo cual no existen concentraciones plasmáticas de relevancia tras la aplicación.

MECANISMO DE ACCIÓN

Es un anestésico local que penetra en forma no ionizada la zona lipídica de la membrana plasmática de la célula, desorganizando los fosfolípidos y disminuyendo su conducción al comprimir los canales de sodio y potasio.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

- No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.



HOLVA FARBIOVET

ANESTÉSICO LOCAL
AEROSOL

REG.SAN: 8A1-12411-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Benzocaína	20 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

- Puede presentar erupciones en la piel, enrojecimiento, picazón, inflamaciones en la boca o garganta; ardor, hinchazón o sensibilidad en el sitio de contacto.
- Gas ecológico, no agrede la capa de ozono.

ESPECIES



DOSIS

MODO DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Limpiar adecuadamente el área a tratar y rociar con cantidad suficiente de HOLVA FARBIOVET esperar 30 segundos antes de iniciar el procedimiento. Repetir la aplicación las veces que sean necesarias según el procedimiento o molestias lo ameriten.

DOSIS: Cantidad suficiente para cubrir la parte afectada y superficies adyacentes.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No utilizar juntamente con productos químicos que contengan parabenos, parafenilendiamina o derivados de ésteres.

REACCIONES ADVERSAS

Después de la aplicación tópica se podrían presentar erupciones cutáneas, zonas de enrojecimiento o picazón leve en pacientes sensibles a la molécula; si es el caso, se sugiere suspender inmediatamente su uso.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Spray x 60ml