



# NEUMOPIG

BACTERINA PARA PREVENCIÓN NEUMONÍA  
SUSPENSIÓN INYECTABLE  
REG. SAN: 4C-13648-AGROCALIDAD



## FÓRMULA

Cada 1 mL contiene  
*Mycoplasma hyopneumoniae* 1-5 X 10<sup>8</sup> UFC  
Vehículo c.s.p. 1 mL

## ESPECIES



## DOSIS

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN		
PRIMO VACUNADOS		
ESPECIE	VOLUMEN	APORTE ( <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> )
LECHONES A partir de la primera semana de edad, (7 días de edad)	2 mL	1 a 5 x 10 <sup>8</sup> UFC/mL
CERDAS PREÑADAS (6 y 2 semanas antes del parto)	4 mL	
REVACUNACIÓN		
LECHONES (21 días de nacidos) 15 días luego de la primera dosis	2 mL	1 a 5 x 10 <sup>8</sup> UFC/mL
HEMBRAS (Antes de cada parto)	2 mL	
MACHOS REPRODUCTORES (Cada 6 meses)	2 mL	
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular		

## INDICACIONES DE USO

NEUMOPIG es una bacterina indicada para la prevención de la neumonía en cerdos, ocasionada por *Mycoplasma hyopneumoniae*.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular.

## DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

La neumonía enzoótica en porcina es una de las enfermedades más comunes que afecta a los cerdos en todo el mundo. Se caracteriza por ser una enfermedad infecciosa, que afecta principalmente a los porcinos jóvenes predisponiéndolos a infecciones bacterianas secundarias.

La neumonía enzootica es un síndrome con baja mortalidad, pero con grave impacto en los parámetros productivos en los cerdos de engorde, disminuyendo la ganancia media diaria y eficiencia

## MECANISMO DE ACCIÓN

Estimula al sistema inmune para la producción de anticuerpos contra antígenos bacterianos específicos, previniendo la colonización de las bacterias: *Mycoplasma hyopneumoniae*, evitando la presentación de neumonía enzoótica en porcinos.



# NEUMOPIG

**BACTERINA PARA PREVENCIÓN NEUMONÍA  
SUSPENSIÓN INYECTABLE  
REG. SAN: 4C-13648-AGROCALIDAD**



## FÓRMULA

Cada 1 mL contiene  
*Mycoplasma hyopneumoniae* 1-5 X 10<sup>8</sup> UFC  
Vehículo c.s.p. 1 mL

## ESPECIES



## DOSIS

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN		
PRIMOVACUNADOS		
ESPECIE	VOLUMEN	APORTE ( <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> )
LECHONES A partir de la primera semana de edad, (7 días de edad)	2 mL	1 a 5 x 10 <sup>8</sup> UFC/mL
CERDAS PREÑADAS (6 y 2 semanas antes del parto)	4 mL	
REVACUNACIÓN		
LECHONES (21 días de nacidos) 15 días luego de la primera dosis	2 mL	1 a 5 x 10 <sup>8</sup> UFC/mL
HEMBRAS (Antes de cada parto)	2 mL	
MACHOS REPRODUCTORES (Cada 6 meses)	2 mL	
<b>VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular</b>		

## PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES

Use todo el contenido, queme los envases y contenido no usado.

No aplicar en animales enfermos.

No congelar.

## INTERACCIONES

No reportado.

## REACCIONES ADVERSAS

En casos esporádicos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna, si sucediera administrar inmediatamente epinefrina, corticoides y/o antihistamínicos según el criterio del Médico Veterinario.

## RETIRO

21 días antes del sacrificio.

## PRESENTACIONES COMERCIALES

- Frascos de 20 mL (10 dosis)
- Frascos de 50 mL (25 dosis)
- Frascos de 100 mL (50 dosis)



# NEUMOPIG

BACTERINA PARA PREVENCIÓN NEUMONÍA  
SUSPENSIÓN INYECTABLE  
REG. SAN: 4C-13648-AGROCALIDAD

