



# RYVERI D FARBIOVET



ANTIBIÓTICO Y ANTIINFLAMATORIO  
AEROSOL  
REG. SAN: 2C4-12410-AGROCALIDAD

## FÓRMULA

Cada 100 ml contiene

Florfenicol	5.0 g
Diclofenaco	
Dietilamonio	4.0 g
Vehículo c.s.p.	100.0 ml

## ESPECIES



## DOSIS

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Aplicar el producto sobre la zona infectada durante dos segundos a 20 cm de distancia hasta obtener una distribución uniforme del producto. Repetir el tratamiento cada 12 horas hasta la recuperación de la lesión.

## INDICACIONES DE USO

RYVERI D FARBIOVET es un antibiótico de amplio espectro, analgésico y antiinflamatorio de uso tópico para lesiones infectadas de las patas de ganado bovino, ovino y porcino causadas por microorganismos sensibles al Florfenicol.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Tópica

## FARMACOCINÉTICA

En bovinos el volumen de distribución es de unos 0,7 L/kg y sólo el 13% de la dosis se une a las proteínas séricas. La vida media sérica promedio es 18 horas, pero existe una amplia variación entre pacientes. El Diclofenaco tópico no se encuentra datos de su biodisponibilidad tópica. Los niveles permanecen aumentados desde 6 horas hasta al menos 18 horas posadministración. A las dosis recomendadas para el uso tópico, la mayor parte de la droga permanece en los tejidos correspondientes al punto de aplicación, pero pueden presentarse niveles detectables en la circulación sistémica.

## MECANISMO DE ACCIÓN

El Florfenicol es un antibiótico de amplio espectro con actividad contra muchas bacterias. Actúan uniéndose al ribosoma 50S, con lo cual inhibe la síntesis proteica bacteriana.

El Diclofenaco es un inhibidor inespecífico de la ciclooxigenasa (tanto de la COX-1 como de la COX-2). También puede tener cierto efecto inhibitorio sobre la lipooxigenasa. Al inhibir la COX-2, el diclofenaco reduce la



# RYVERI D FARBIOVET



ANTIBIÓTICO Y ANTIINFLAMATORIO  
AEROSOL  
REG. SAN: 2C4-12410-AGROCALIDAD

## FÓRMULA

Cada 100 ml contiene

Florfenicol	5.0 g
Diclofenaco	
Dietilamonio	4.0 g
Vehículo c.s.p.	100.0 ml

## ESPECIES



## DOSIS

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Aplicar el producto sobre la zona infectada durante dos segundos a 20 cm de distancia hasta obtener una distribución uniforme del producto. Repetir el tratamiento cada 12 horas hasta la recuperación de la lesión.

producción de prostaglandinas asociadas con dolor, hiperpirexia e inflamación.

## PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES

Solo para uso externo. No administrar en animales en gestación. No ingerir. No aplicar en los ojos, mucosas.

## INTERACCIONES

No aplicar con otros productos al mismo tiempo como cicatrizantes (aerosoles, cremas dérmicas).

## REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente reacciones locales en animales con hipersensibilidad al Florfenicol.

## RETIRO

Ninguno

## PRESENTACIONES COMERCIALES

Spray x 60 ml