



BRONQUITIS FARBIOVET

VACUNA AVIAR
LIOFILIZADO + DILUYENTE
REG. SAN: 4A-11153-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada dosis contiene:
Virus del serotipo Massachusetts
de la enfermedad de Bronchitis
 $\geq 1 \times 10^4$ DIE₅₀/Dosis

Excipientes c.s.p. 1 dosis

ESPECIES



DOSIS

ESPECIE	DOSIS
Aves entre 2 y 4 semanas de edad.	1 gota equivalente a 1 dosis
VÍA DE ADMINISTRACIÓN	
Intranasal, Conjuntival, Oral o Aerosol.	

Para mejor inmunización, revacunar a los 7 días de la primera vacunación, luego cada 6 meses.

INDICACIONES DE USO

Esta vacuna se recomienda para la administración en aves sanas, como auxiliar en la prevención de la Bronchitis infecciosa serotipo Massachusetts

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intranasal, Conjuntival, Oral o en Aerosol.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

La Bronchitis Infecciosa (BI) es una enfermedad viral que afecta a aves (pollos y gallinas) de todas las edades. Es causada por el virus de la Bronchitis Infecciosa (VBI). Afecta al tracto respiratorio y urogenital, provocando signos como tos, descargas nasales, lagrimeo, disminución en la postura de huevos, entre otros.

Si llega a causar daño a nivel renal se incrementa el consumo de agua, diarrea moderada, deshidratación y una elevada mortalidad.

MECANISMO DE ACCIÓN

Estimula una replicación viral tenue en el animal, pero no provoca una enfermedad clínica, brindando así inmunidad activa y protegiendo a las aves de una exposición natural al virus de la Bronchitis infecciosa.

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES

Aplicar la vacuna inmediatamente después de su reconstitución, ya que los rayos solares deterioran el producto.



BRONQUITIS FARBIOVET

VACUNA AVIAR
LIOFILIZADO + DILUYENTE
REG. SAN: 4A-11153-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada dosis contiene:
Virus del serotipo Massachusetts
de la enfermedad de Bronquitis
 $\geq 1 \times 10^4$ DIE₅₀/Dosis

Excipientes c.s.p. 1 dosis

ESPECIES



DOSIS

ESPECIE	DOSIS
Aves entre 2 y 4 semanas de edad.	1 gota equivalente a 1 dosis
VÍA DE ADMINISTRACIÓN	
Intranasal, Conjuntival, Oral o Aerosol.	

Para mejor inmunización, revacunar a los 7 días de la primera vacunación, luego cada 6 meses.

No guardar sobrantes, los restos de la vacuna deben ser desechados. No congelar.

No vacunar animales enfermos, administrar solo a animales sanos.

En caso de contacto accidental con el ojo humano puede presentar un cuadro clínico de conjuntivitis que dura de 2 a 3 días. Evite tocarse los ojos cuando trabaje con esta vacuna.

INTERACCIONES

No reportado.

REACCIONES ADVERSAS

En casos extremadamente escasos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna.

Se pueden presentar ligeras dificultades respiratorias después de la vacunación, estas suelen desaparecer en un plazo de dos semanas.

La vacunación de emergencia en gallinas ponedoras no inmunizadas puede provocar la caída en producción de huevos la cual puede volver a restablecerse.

RETIRO

Ninguno

PRESENTACIONES COMERCIALES

- Frascos de 50 dosis
- Frascos de 100 dosis
- Frascos de 500 dosis
- Frascos de 1000 dosis
- Frascos de 2500 dosis