CIPERJABÓN

ECTOPARASITICIDA
JABÓN
REG. SAN: 3B1-2-9795-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 90 g contiene:

Cipermetrina	1.285 g
Excipientes c.s.p.	90 g

ESPECIES

DOSIS

MODO DE USO

- Aplicar en forma generosa sobre el pelo y piel del animal completamente mojado, dando masajes vigorosos hasta lograr crear abundante espuma.
- Dejar actuar por 10 minutos. NO sobrepasar este tiempo.
- Enjuagar hasta remover todo el producto.
- Repetir los tratamientos en base a la prevalencia de parásitos en el lugar y a la posibilidad de reinfestaciones.

INDICACIONES DE USO

CIPERJABÓN es un antiparasitario externo, indicado en el control de: pulgas, garrapatas y piojos en caninos y felinos. Útil como coadyuvante en el tratamiento de dermatitis y seborreas ocasionadas por acción de parásitos externos, así como de lesiones localizadas producidas por los mismos. Tiene acción desodorante y aromatizante.

VÍA DE APLICACIÓN: Tópica

FARMACOCINÉTICA

La cipermetrina es lipofílica. El metabolismo de los piretroides sintéticos es muy similar en todos los mamíferos, produciéndose una separación del enlace éster para formar ácido fenoxibenzóico y derivados del ácido ciclopropanocarboxilico, los cuales se excretan conjugados.

MECANISMO DE ACCIÓN

Es un ectoparasiticida de contacto del grupo de los piretroides tipo II, se caracteriza por contener un grupo alfa-ciano en su molécula. Los piretroides tipo II afectan principalmente a los canales de sodio en la membrana nerviosa del parásito, y ocasionan un incremento transitorio en la permeabilidad del sodio, durante la excitación. Mantienen la modificación de los canales de sodio de forma persistente, despolarizan la membrana y bloquean el potencial de acción sin causar actividad repetitiva presináptica. Otro posible mecanismo de acción de los piretroides tipo II incluye una acción sobre el complejo receptor del GABA.

CIPERJABÓN

ECTOPARASITICIDA
JABÓN
REG. SAN: 3B1-2-9795-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 70 g contiene:

Cipermetrina	1 g
Excipientes c.s.p.	70 g

ESPECIES

DOSIS

MODO DE USO

- Aplicar en forma generosa sobre el pelo y piel del animal completamente mojado, dando masajes vigorosos hasta lograr crear abundante espuma.
- Dejar actuar por 10 minutos. NO sobrepasar este tiempo.
- Enjuagar hasta remover todo el producto.
- Repetir los tratamientos en base a la prevalencia de parásitos en el lugar y a la posibilidad de reinfestaciones.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

-Evitar el contacto con los ojos y membranas mucosas.
-Evitar la ingestión y no almacenar junto a productos alimenticios.
-No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.
-Se sugiere la utilización de guantes para la aplicación del producto.
-Evitar que las mujeres en periodo de gestación tengan contacto con el producto.
-Se sugiere que los propietarios o el médico laven sus manos después de la aplicación.

Antídoto: en caso de intoxicación por ingesta del producto puede utilizar carbón activado por vía oral. Acuda lo antes posible al Médico Veterinario.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Evitar la administración concurrente con otro ectoparasiticida tópico.

REACCIONES ADVERSAS

La hipersensibilidad y las reacciones irritativas locales son posibles. La posibilidad de irritación se incrementa a medida que aumenta la concentración de la clorhexidina; no se recomienda su uso durante un tiempo prolongado, en particular sobre tejido de granulación.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Caja x 90 g