



# PULGA OUT SPRAY

ECTOPARASITICIDA  
SOLUCIÓN TÓPICA

REG. SAN: 3B1-13512-AGROCALIDAD

## FÓRMULA

Cada 100ml contiene:

Fipronil	0.25 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

## ESPECIES



## DOSIS

### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN



Aplicar sobre la piel directamente, separando el pelo.  
De 3 a 6 mL por Kg de peso según la cantidad de ectoparásitos presentes (1 mL equivale a 3 pulsaciones).

Generalmente se recomienda una sola dosis. Repetir los tratamientos de acuerdo al grado de infestación.  
Frente a infestaciones de *Ctenocephalides felis*, repetir el tratamiento cada 2 a 3 meses, por *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis* y *ricinos* & *Dermacentor reticulatus* cada mes, en felinos cada 5 semanas, o según la recomendación del Médico veterinario.  
Para el control de cucarachas, insectos y hormigas, aplicar directamente en el sitio.

## INDICACIONES DE USO

PULGA OUT SPRAY está indicado en el control y tratamiento de infestaciones por ectoparásitos: pulgas, garrapatas, ácaros, piojos, insectos y hormigas.

Previene posteriores infestaciones por pulgas debido a su efecto adulticida y larvicida. Su acción es prolongada por el efecto residual del fipronil.

Se sugiere aplicar en el entorno para el control de cucarachas, insectos y hormigas.

**VÍA DE APLICACIÓN:** Tópica

## FARMACOCINÉTICA

Aplicado por vía tópica al parecer se disemina por todo el cuerpo, en aproximadamente, 24 horas.

## MECANISMO DE ACCIÓN

Está indicado para el tratamiento de las infestaciones por pulgas, garrapatas o piojos masticadores. El fipronil es un antiparasitario derivado del fenilpirazol, el cual interfiere en los intervertebrados con el pasaje de los iones cloruro en los canales para cloruro, regulados por el GABA; de manera que interrumpe la actividad del SNC, generando la muerte de los parásitos. Generalmente, el fipronil se acumula en la grasitud de la piel y de los folículos pilosos y, continúa liberándose durante cierto tiempo, lo que da lugar a una prolongada actividad residual.

**PRECAUCIONES**

**- ADVERTENCIAS**

**CONTRAINDICACIONES**



# PULGA OUT SPRAY

ECTOPARASITICIDA  
SOLUCIÓN TÓPICA

REG. SAN: 3B1-13512-AGROCALIDAD

## FÓRMULA

Cada 100ml contiene:

Fipronil	0.25 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.

No administrar a pacientes con hipersensibilidad al activo. A la aplicación, el operador debe: evitar el contacto con su piel (especialmente si ésta se encuentra lastimada), ojos y mucosas. No inhalar el producto. Lavarse bien las manos, con agua y jabón, después de la aplicación.

Se debe evitar su uso en cachorros menores de 6 semanas de edad.

## ESPECIES



## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS



Evitar el uso concurrente con otro ectoparasiticida tópico.

## REACCIONES ADVERSAS

Rara vez se informan reacciones de hipersensibilidad, sin embargo, podría ocurrir una irritación temporal en el sitio de aplicación en pacientes sensibles.

## DOSIS

### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

 Caninos	Aplicar sobre la piel directamente, separando el pelo. De 3 a 6 mL por Kg de peso según la cantidad de ectoparásitos presentes (1 mL equivale a 3 pulsaciones).
 Felinos	

Generalmente se recomienda una sola dosis. Repetir los tratamientos de acuerdo al grado de infestación.

Frente a infestaciones de *Ctenocephalides felis*, repetir el tratamiento cada 2 a 3 meses, por *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis* y *ricinos* & *Dermacentor reticulatus* cada mes, en felinos cada 5 semanas, o según la recomendación del Médico veterinario.

Para el control de cucarachas, insectos y hormigas, aplicar directamente en el sitio.

## RETIRO

En caninos y felinos no aplica el tiempo de retiro.

## PRESENTACIONES COMERCIALES

Spray x 60 ml

Spray x 100 ml