



MAL BOBO

BACTERINA PARA EL CONTROL
NEUMOENTERITIS
SUSPENSIÓN INYECTABLE
REG. SAN: 4C-8510-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada dosis mL contiene:

<i>Pasteurella multocida</i>	≥1X10 ⁸ UFC
<i>Pasteurella haemolytica</i>	≥1X10 ⁸ UFC
<i>E. coli</i>	≥1X10 ⁸ UFC
<i>Salmonella typhimurium</i>	≥1X10 ⁸ UFC
Excipientes c.s.p.	1 ml

ESPECIES



DOSIS

DOSIFICACIÓN		
ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vacas Preñadas	5 ml	Intramuscular o Subcutanea
Terneros en la primera hasta los 4 meses	5 ml	Intramuscular o Subcutanea

VACUNACIÓN:
Recomendación: En caso de terneros se puede repetir el proceso a los 15 días

INDICACIONES DE USO

MAL BOBO es una bacterina indicada para el control de la neumoenteritis en terneros recién nacidos y para la creación de anticuerpos maternos en vacas preñadas 30 días antes del parto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o Intramuscular.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

La neumoenteritis es una afección que se produce en los terneros a los pocos días de su nacimiento. Se la denomina también como peste boba, neumoenteritis, diarrea blanca, diarrea colibacilar o salmonelosis. La patogenia de la enfermedad está centrada en la pérdida de líquidos y electrolitos.

Los principales signos clínicos enfermedad son: problemas respiratorios, diarrea blanca, en ocasiones se presenta onfaloflebitis, deterioro en la condición corporal, deshidratación e incluso la muerte.

MECANISMO DE ACCIÓN

Estimula al sistema inmune para la producción de anticuerpos contra antígenos bacterianos específicos, previniendo la colonización de las bacterias: *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *E. coli* y *Salmonella typhimurium*. Evitando así la presentación neumoenteritis en terneros.



MAL BOBO

BACTERINA PARA EL CONTROL
NEUMOENTERITIS
SUSPENSIÓN INYECTABLE
REG. SAN: 4C-8510-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada dosis mL contiene:

<i>Pasteurella multocida</i>	≥1X10 ⁸ UFC
<i>Pasteurella haemolytica</i>	≥1X10 ⁸ UFC
<i>E. coli</i>	≥1X10 ⁸ UFC
<i>Salmonella typhimurium</i>	≥1X10 ⁸ UFC
Excipientes c.s.p.	1 ml

ESPECIES



DOSIS

DOSIFICACIÓN		
ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vacas Preñadas	5 ml	Intramuscular o Subcutanea
Terberos en la primera hasta los 4 meses	5 ml	Intramuscular o Subcutanea

VACUNACIÓN:
Recomendación: En caso de terberos se puede repetir el proceso a los 15 días

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES

No guardar sobrantes. Los restos de la vacuna deben ser desechados, de preferencia incinerados.
No congelar
Vacunar sólo animales sanos.

INTERACCIONES

No reportado.

REACCIONES ADVERSAS

En casos esporádicos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna, si sucediera administrar inmediatamente epinefrina, corticoides y/o antihistamínicos según el criterio del Médico Veterinario.

RETIRO

Ninguno

PRESENTACIONES COMERCIALES

- Frascos de 5 ml (1 dosis)