



# PORCIVIR

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN  
DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA  
LIOFILIZADO + DILUYENTE  
REG. SAN: 4A-9863-AGROCALIDAD



## FÓRMULA

Cada dosis contiene:  
Virus vivo modificado atenuado un 80% de  
Cólera Porcina Clásica, cepa China lapinizada  
con un título mayor a  $10^{-3}$  DL 50% IFCT.

## ESPECIES



## DOSIS

DOSIFICACIÓN		
ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Porcinos 6 semanas en adelante	2 ml	Intramuscular
<b>VACUNACIÓN:</b> Revacunar anualmente a los cerdos destinados a reproducción.		

## INDICACIONES DE USO

PORCIVIR es una vacuna indicada para la  
prevención del Cólera Porcino o Peste Porcina  
Clásica. Puede ser utilizada en cerdos de 6 semanas  
en adelante y hembras gestantes.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular.

## DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

La peste porcina clásica, también conocida como  
cólera porcino, es una enfermedad vírica contagiosa  
de los cerdos domésticos y salvajes. La enfermedad  
tiene formas agudas y crónicas y puede ser grave,  
con una alta mortalidad, o leve, incluso inaparente.  
En la forma aguda de la enfermedad, en todos los  
grupos de edad, hay fiebre, acurrucamiento, pérdida  
de apetito, apatía, debilidad, conjuntivitis,  
estreñimiento seguido de diarrea, y andadura  
irregular.

Varios días después del inicio de los signos clínicos,  
las orejas, el abdomen y la cara interna de las  
extremidades pueden presentar una decoloración  
púrpura.

## MECANISMO DE ACCIÓN

Estimula una replicación tenue del virus en el  
animal, pero no provoca una enfermedad clínica,  
brindando así inmunidad activa y protegiendo a los  
cerdos de una exposición natural al virus de la Peste  
Porcina Clásica.



# PORCIVIR

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN  
DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA  
LIOFILIZADO + DILUYENTE  
REG. SAN: 4A-9863-AGROCALIDAD



## FÓRMULA

Cada dosis contiene:  
Virus vivo modificado atenuado un 80% de  
Cólera Porcina Clásica, cepa China lapinizada  
con un título mayor a  $10^{-3}$  DL 50% IFCT.

## ESPECIES



## DOSIS

DOSIFICACIÓN		
ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Porcinos 6 semanas en adelante	2 ml	Intramuscular

**VACUNACIÓN:**  
Revacunar anualmente a los cerdos destinados a  
reproducción.

## PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES

Usar inmediatamente después de reconstituir el  
producto. No guardar sobrantes.  
Aplicar en sólo en animales sanos.  
No congelar.

## INTERACCIONES

No reportado.

## REACCIONES ADVERSAS

En casos esporádicos, puede presentarse una  
reacción alérgica a la aplicación de la vacuna, si  
sucediera administrar inmediatamente epinefrina,  
corticoides y/o antihistamínicos según el criterio del  
Médico Veterinario.

## RETIRO

Ninguno.

## PRESENTACIONES COMERCIALES

- Frascos de 4 ml (2 dosis)
- Frascos de 10 ml (5 dosis)
- Frascos de 20 ml (10 dosis)
- Frascos de 50 ml (25 dosis)