



TILOSINA-FARBIO

ANTIIBIÓTICO
SOLUCIÓN ORAL

REG. SAN: RIP-02-FAR-00304



FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:

Tilosina tartrato	20 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES



FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:

Tilosina tartrato	20 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES



INDICACIONES DE USO

TILOSINA-FARBIO es un antibiótico macrólido con acción bacteriostática. Posee espectro de acción contra bacterias grampositivas y algunas gramnegativas.

En caninos y felinos útil en el control y tratamiento de diarreas causadas por Clostridium o Campylobacter, cuando no han respondido a otros tratamientos. Ideal en casos de colitis bacteriana.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

FARMACOCINÉTICA

El tartrato de tilosina se absorbe bien en el tracto gastrointestinal, principalmente en el intestino. La tilosina se distribuye bien en el cuerpo después de la absorción sistémica, con la excepción de la penetración en el LCR.

El volumen de distribución de tilosina es de 1,7 L / kg en animales pequeños. Se elimina en la orina y la bilis aparentemente como fármaco inalterado. La vida media de eliminación es de 54 minutos en animales pequeños.

MECANISMO DE ACCIÓN

Se cree que la tilosina tiene el mismo mecanismo de acción que la eritromicina (se une al ribosoma 50S e inhibe la síntesis de proteínas) y exhibe un espectro de actividad similar. Es un antibiótico bacteriostático.

La tilosina también puede tener efectos inmunomoduladores sobre la inmunidad mediada por células.



TILOSINA-FARBIO

ANTIBIÓTICO
SOLUCIÓN ORAL

REG. SAN: RIP-02-FAR-00304



FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:

Tilosina tartrato	20 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES



FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:

Tilosina tartrato	20 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES



En perros, la tilosina aumenta las concentraciones de enterococos (*Enterococcus fecalis*) en el yeyuno. Se cree que los enterococos tienen efectos probióticos.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

La tilosina está contraindicada en pacientes hipersensibles a ella o a otros antibióticos macrólidos (por ejemplo, la eritromicina).

No administrar el producto en especies no autorizadas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se han reportado.

REACCIONES ADVERSAS

La tilosina puede causar diarrea en algunos animales. Sin embargo, el tratamiento oral para la colitis en perros se ha administrado durante varios meses con seguridad.

En caninos podría intensificarse la diarrea antes de remitir el cuadro infeccioso.

RETIRO

En caninos y felinos no aplica el tiempo de retiro.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco x 60 mL.



TILOSINA-FARBIO

ANTIBIÓTICO
SOLUCIÓN ORAL

REG. SAN: RIP-02-FAR-00304



FÓRMULA



Cada 100 mL contiene:

Tilosina tartrato 20 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES



DOSIS

DOSIFICACIÓN			
ESPECIES	DOSIS REFERENCIAL	DOSIS PRÁCTICA	INDICACIONES DE USO
 CANINOS	25 mg / Kg	0,5 mL / 4 Kg	En enfermedad intestinal (diarrea ideopática) repetir la dosis cada 24 horas, mínimo durante 7 días.
	20 mg / Kg	0,5 mL / 5 Kg	En colitis repetir la dosis cada 8 horas, si hay respuesta positiva aumentar el intervalo a cada 12 horas y eventualmente a cada 24 horas. Administrar siempre con comida.
 FELINOS	10 mg / Kg	0,2 mL / 4 Kg	En diarrea asociada con <i>Cryptosporidium spp</i> repetir la dosis cada 12 horas, si en la primera semana se ve resultados y no hay irritación gastrointestinal, continuar hasta por 1 semana después de controlado el cuadro.

Vía de administración: Oral
Los intervalos de dosis y la duración del tratamiento pueden variar de acuerdo a la patología y al criterio del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:

Tilosina tartrato 20 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES

