

FIPROKILL

ANTIPARASITARIO EXTERNO, REPELENTE Y CICATRIZANTE

Aerosol

REG. SAN: RIP-02-FAR-01997



Composición:

Cada 100 mL contiene:

Fipronil	1 g
Sulfadiazina Base (Equivalente a sulfadiazina de plata 0,07g)	0,1 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

Indicaciones:

FIPROKILL es un insecticida, repelente y cicatrizante de uso tópico, indicado para la prevención y el control de la miasis cutánea. Gracias a la acción residual del fipronil, proporciona una protección prolongada frente a la infestación por moscas y otros parásitos externos. Sus propiedades larvicidas, repelentes, antisépticas, hemostáticas y cicatrizantes protegen las heridas y zonas expuestas, formando una barrera protectora que previene el desarrollo de larvas. Además, favorece la recuperación del tejido afectado, ayuda a controlar infecciones secundarias y promueve el proceso natural de cicatrización.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

- Control integral: Combina la acción ectoparasiticida del fipronil con la actividad antimicrobiana de la sulfadiazina de plata, contribuyendo al control de ectoparásitos y la protección de la piel lesionada.
- Acción prolongada contra parásitos: El fipronil se distribuye sobre la piel y el folículo piloso, proporcionando un efecto residual frente a pulgas, garrapatas, piojos, ácaros y moscas.
- Amplia versatilidad de uso: Puede emplearse en diferentes especies y en diversas lesiones cutáneas superficiales.

Especies y Dosis:



Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos: Rocíar la cantidad suficiente sobre el área a tratar. En casos de miasis profundas, se recomienda limpiar, lavar la herida y aplicar en las partes profundas de la herida hasta cubrir la zona afectada.

La frecuencia y duración del tratamiento dependen del grado de infestación según criterio del Médico Veterinario.



FIPROKILL

ANTIPARASITARIO EXTERNO, REPELENTE Y CICATRIZANTE

Aerosol

REG. SAN: RIP-02-FAR-01997



Farmacocinética

Fipronil El fármaco se distribuye en la piel, específicamente en las glándulas sebáceas, capas epiteliales que rodean los pelos y parte expuesta del pelo dos meses después del tratamiento, demostrándose así la difusión pasiva a través del sebo que recubre la piel y el pelo. La principal vía de eliminación del Fipronil y sus metabolitos es por las heces.

Sulfadiazina de plata Una vez en la circulación sistémica, la sulfadiazina se distribuye ampliamente por todos los tejidos, cruzando con facilidad las membranas celulares. La sulfadiazina se metaboliza en el hígado, se elimina por la orina, conjuntamente.

Mecanismo de acción:

Fipronil Actúa bloqueando los canales de cloro regulados por GABA en el sistema nervioso de los artrópodos, provocando hiperexcitación, parálisis y muerte del parásito. Su metabolito, fipronil sulfona, potencia esta acción principalmente contra garrapatas.

Sulfadiazina de plata Actúa liberando iones de plata con efecto bactericida superficial, los cuales alteran la pared y membrana celular bacteriana, interfieren en la replicación del ADN y favorecen la formación de radicales libres, provocando la muerte de las bacterias.

Precauciones – Advertencias - Contraindicaciones:

- No administrar en hembras gestantes, débiles, caquéticos, con problemas gastrointestinales, infecciones graves, enfermedades hepáticas, alteraciones hematológicas o con déficit de glucosa.
- No administrar en paciente con hipersensibilidad conocida a los activos.

Interacciones:

No se han reportado interacciones farmacológicas específicas.

Reacciones adversas:

- Usar con precaución. Se recomienda el uso de guantes al manipular el producto.
- Puede causar ligera irritación a nivel cutáneo y ocular.

Antídoto:

No existe un antídoto específico. En caso de intoxicación bañe inmediato al paciente con abundante agua y jabón neutro o alcalino para eliminar residuos del producto. En caso de ingestión realice un lavado gástrico, seguido de la administración de carbón activado y un catártico para limitar la absorción del tóxico y favorecer su eliminación.

FIPROKILL

ANTIPARASITARIO EXTERNO, REPELENTE Y CICATRIZANTE

Aerosol

REG. SAN: RIP-02-FAR-01997



Retiro:

Carne: 0 días

Leche: No administrar en animales productores de leche para consumo humano.

Presentaciones comerciales:

Frasco x 250 mL.



Elaborado y distribuido por: **FARBIOPHARMA S.A.**
Dirección: Calle Guayas Nº E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag.
Telf: (593) 2 2794046
+593 99 968 4047 / +593 99 164 6785
Quito - Ecuador
www.farbiopharma.com