

GUSANEO PLUS

REPELENTE, LARVICIDA.

Aerosol

REG. SAN: RIP-02-FAR-01989



Composición:

Cada 100 mL contiene:

Triclorfón	1.25 g
Cipermetrina	1.30 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

Indicaciones:

GUSANERO PLUS es un insecticida y repelente de uso tópico, especialmente indicado para la prevención y tratamiento de la miasis cutánea. Gracias a su acción larvicida y repelente, protege eficazmente las heridas o zonas expuestas contra la infestación de moscas y el desarrollo de sus larvas; además de repeler garrapatas, piojos y pulgas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

Especies y Dosis:



Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos:

Rociar la cantidad suficiente sobre el área a tratar.

En casos de miasis profundas, se recomienda limpiar, lavar la herida y aplicar en las partes profundas de la herida hasta cubrir la zona afectada.

Administrar cada 24 horas, la duración del tratamiento depende del grado de infestación según criterio del Médico Veterinario.

GUSANERO PLUS

REPELENTE, LARVICIDA

Aerosol

REG. SAN: RIP-02-FAR-01989



Farmacocinética

Triclorfón: Absorción: Por sus características liposolubles, se absorbe fácilmente por piel.

Distribución: Se distribuye en todos los tejidos (hay que tener cuidado con hembras gestantes).

Excreción: Se excreta por vía renal, heces, sudor y por vía aérea.

Cipermetrina: La absorción se realiza por todas las vías, inhalatoria, digestiva, y en menor grado por la cutánea. Su metabolismo se realiza por hidrólisis o por hidroxilación o por ambos mecanismos, a través del sistema de las monooxigenasas microsomales. La eliminación se realiza en mayor grado por materia fecal

Mecanismo de acción:

Triclorfón: Inactiva la acetil-colinesterasa irreversiblemente tanto en los mamíferos como en los parásitos y se presentan signos típicos de sobreestimulación colinérgica. Los parásitos así tratados serán incapaces de coordinarse y serán expulsados fácilmente del intestino o no podrán seguir aferrados en su sitio en el caso de los ectoparásitos.

Cipermetrina: Los piretroides tipo II afectan principalmente a los canales de sodio en las células nerviosas de los insectos y causa un volteo no letal mediante la falta de conducción de los nervios periféricos con posterior efecto sobre el sistema nervioso central, la muerte se produce por inanición

Precauciones – Advertencias - Contraindicaciones:

- No administrar en hembras gestantes, débiles, caquéticos, con problemas gastrointestinales o infecciones graves.
- No administrar en paciente con hipersensibilidad conocida a los activos.
- Se recomienda el uso de guantes al manipular el producto.
- Puede presentarse reacciones colinérgicas, tales como disnea, broncoconstricción, hipersalivación, espasmos musculares, lagrimeo y miosis. En estos casos, se recomienda aplicar previamente una dosis de atropina.

Interacciones:

No administrar junto con metrifonato, carbamatos, derivados de la succinilcolina, fenotiazinas, levamisol, morantel, pirantel y neostigmina.

GUSANERO PLUS

REPELENTE, LARVICIDA.

Aerosol

REG. SAN: RIP-02-FAR-01989



Reacciones adversas:

- El cuadro de intoxicación con triclorfón presenta efectos colinérgicos nicotínicos y muscarínicos, como disnea, broncoconstricción, aumento de secreciones bronquiales, salivación, lagrimeo, miosis, aumento de secreciones gastrointestinales, temblor, espasmos musculares, con la consecuente fatiga de los músculos intercostales esto provoca una disnea aún más marcada.

- Cipermetrina

Los piretroides son relativamente poco tóxicos debido a su pobre absorción desde la piel.

ANTÍDOTO:

No existe un antídoto específico para el producto; sin embargo, en caso de intoxicación por triclorfón se recomienda el uso de atropina. En caso de intoxicación por contacto dérmico lavar con abundante agua y jabón alcalino o suero fisiológico. En caso de ingestión accidental, instaurar tratamiento sintomático y de soporte; según la especie y criterio del Médico Veterinario, puede considerarse la inducción de la emesis o lavado gástrico. En caso de convulsiones, administrar la terapia anticonvulsivante correspondiente.

Retiro:

Carne: 21 días

Leche: 10 días

Presentaciones comerciales:

- Frasco x 100 ml
- Frasco x 250 ml
- Frasco x 500 ml



Elaborado y distribuido por: **FARBIOPHARMA S.A.**
Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag.
Telf: (593) 2 2794046
+593 99 968 4047 / +593 99 164 6785
Quito - Ecuador
www.farbiopharma.com