

MENBUTONA FARBIOPHARMA

ESTIMULADOR Y NORMALIZADOR HEPATODIGESTIVO

Solución Inyectable

REG. SAN: RIP-02-FAR-02016



Composición:

Cada 100 mL contiene:
Menbutona 10 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

Indicaciones:

MENBUTONA FARBIOPHARMA es un potente estimulador de la actividad hepatodigestiva indicado en trastornos digestivos e insuficiencia hepática. Incrementa las secreciones pancreáticas, gástricas, duodenales y biliares, favoreciendo el tránsito intestinal y asimilación de los alimentos. Además, actúa como coadyuvante de la función hepática con efecto desintoxicante, antioxidante y modulador redox, contribuyendo a normalizar la función digestiva, mejorar el apetito y la motilidad gastroentérica.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta o intramuscular profunda.

- Acción multiorgánica: Actúa simultáneamente sobre el sistema digestivo, hepático y biliar.
- No afecta al Sistema Nervioso Autónomo: Estimula de forma específica las glándulas secretoras sin ejercer acción sobre el sistema parasimpático, reduciendo los efectos colaterales.
- Amplia versatilidad de uso: Puede utilizarse en diversas especies de destino.
- Favorece el desempeño de antiparasitarios: Mejora la absorción y biodisponibilidad de algunos antiparasitarios orales (Albendazol, Fenbendazol, Oxfendazol, Closantel, Triclabendazol y Rafoxanida).

Especies y Dosis:




Bovinos: 1mL/10-20Kg IM, IV

Equinos: 1mL/20-40Kg IV

Ovinos, Caprinos, Porcinos y Caninos: 1mL/10-20Kg IM, IV

La frecuencia y duración del tratamiento depende del criterio del Médico Veterinario.



MENBUTONA FARBIOPHARMA

ESTIMULADOR Y NORMALIZADOR HEPATODIGESTIVO

Solución Inyectable

REG. SAN: RIP-02-FAR-02016



Farmacocinética

La menbutona presenta absorción intramuscular rápida y prácticamente completa con una biodisponibilidad cercana al 100 %, alcanzando concentraciones plasmáticas máximas de 18,8 µg/mL aproximadamente a las 3,75 horas tras su administración, una distribución moderada principalmente en el compartimento extracelular, y una eliminación relativamente rápida con una vida media cercana a 6 horas. Tras la administración intravenosa presenta un volumen de distribución en estado estacionario de 310,4 mL/Kg, un aclaramiento sistémico de 71,9 mL/h/Kg y una vida media terminal de eliminación de 4,53 horas. Estas características permiten alcanzar concentraciones plasmáticas terapéuticas de forma eficaz tras la administración intramuscular, con una exposición sistémica comparable a la obtenida por vía intravenosa, existe una amplia variabilidad individual. Se necesitan más estudios para caracterizar la farmacocinética de la menbutona, así como para evaluar las posibles interacciones farmacológicas beneficiosas que puedan producirse.

Mecanismo de acción:

La menbutona tiene actividad colerética y colagoga, que actúa principalmente sobre el hígado, el páncreas y el estómago. Incrementa la secreción biliar, así como el volumen de pigmentos, materia seca y sales biliares, produciendo un verdadero efecto colerético hepático; sin embargo, en caninos se ha descrito un efecto hidrocolerético caracterizado por un aumento del volumen total de bilis acompañado de una disminución de la concentración de materia seca y ácido cólico. Además, estimula la secreción de jugo pancreático e incrementa transitoriamente la cantidad de tripsina, mientras que a nivel gástrico aumenta ligeramente la producción de jugo gástrico y, de forma temporal, el contenido de pepsina. Como resultado, aumenta la actividad digestiva entre 2 y 4,5 veces respecto a los niveles basales, efecto que persiste durante aproximadamente 2 a 3 horas, aunque la respuesta clínica puede prolongarse por más tiempo. Estas acciones favorecen la digestión y absorción de nutrientes a nivel intestinal, mejoran el apetito, estimulan la motilidad gastrointestinal y contribuyen al restablecimiento de la función digestiva en animales con trastornos digestivos o insuficiencia hepatobiliar funcional.

Precauciones – Advertencias - Contraindicaciones:

Ninguna conocida.

Interacciones:

Ninguna conocida.

Reacciones adversas:

Tras la administración intravenosa de menbutona, los pacientes pueden presentar de forma transitoria disnea y epífora; mientras que, tras la administración intramuscular, pueden observarse signos de dolor o prurito en el sitio de aplicación.

MENBUTONA FARBIOPHARMA

ESTIMULADOR Y NORMALIZADOR HEPATODIGESTIVO

Solución Inyectable

REG. SAN: RIP-02-FAR-02016




Retiro:

Carne y Leche: 0 días.

Presentaciones comerciales:

Frasco de 100 mL.



Elaborado y distribuido por: **FARBIOPHARMA S.A.**
Dirección: Calle Guayas Nº E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag.
Telf: (593) 2 2794046
+593 99 968 4047 / +593 99 164 6785
Quito - Ecuador
www.farbiopharma.com